

Klinik für Internistische Onkologie und Hämatologie mit integrierter Palliativmedizin

Schriftenverzeichnis

Originalarbeiten (Auszug ab 2015)

2018:

Stahl M, Maderer A, Lordick F, Mihaljevic A, Kanzler S, Hoehler T, Thuss-Patience P, Mönig S, Kunzmann V, Schroll S, Sandermann A, Tannapfel A, Meyer HJ, Schuhmacher C, Wilke H, Moehler M.

Perioperative chemotherapy with or without epidermal growth factor receptor blockade in unselected patients with locally advanced oesophagogastric adenocarcinoma: randomized phase II study with advanced biomarker program of the German Cancer Society (AIO/CAO STO-0801)

Eur Cancer 2018; 93:119-26.

Knödler M, Körfer J, Kunzmann V, Trojan J, Daum S, Schenk M, Kullmann F, Schroll S, Behringer D, Stahl M, Al-Batran S, Hacker U, Ibach S, Linhofer H, Lordick F.

Randomized phase II study to investigate catumaxumab (anti-EpCAM x anti-CD3) for treatment of peritoneal carcinomatosis in patients with gastric cancer.

Br Cancer 2018; doi.org/10.1038/s41416-018-0150-6.


Proteomics Clin Appl. 2012 Apr; 6(3-4):163-9.

2017:

Stahl M, Walz M, Riera-Knorrenschild J, Stuschke M, Sandermann A, Bitzer M, Wilke H, Budach W.

Preoperative chemotherapy versus chemoradiotherapy in locally advanced adenocarcinomas of the oesophagogastric junction (POET): Long-term results of a controlled randomised trial.

Eur J Cancer 2017; 81:183-90.



2016:

Jordan K, Luetkens T, Gog C, Killing B, Arnold D, Hinke A, Stahl M, Freier W, Rüssel J, Atanakovic D, Hegewisch-Becker S.

Intraperitoneal bevacizumab for control of malignant ascites due to advanced-stage gastrointestinal cancers: a multicentre double-blind, placebo-controlled phase II study – AIO SUP-0108.

Eur Cancer 2016; 63:127-34.

Hölscher A, Stahl M, Messmann H, Stuschke M, Meyer HJ, Porschen R.

Die neue S3-Leitlinie zum Ösophaguskarzinom. Wichtige chirurgische Aspekte.

Chirurg 2016; 87:865-72

Vogel A, Römmler-Zehrer J, Li J, McGovern D, Romano A, Stahl M.

Efficacy and safety profile of nab-paclitaxel plus gemcitabine in patients with metastatic pancreatic cancer treated to disease progression: a subanalysis from a phase 3 trial (MPACT).

BMC Cancer 2016; 16:817-26

2015:

Kumagai K, Rouvelas I, Tsai JA, Mariosa D, Lind PA, Lindblat M, Ye W, Lundell L, Schuhmacher C, Mauer M, Burmeister BH, Thomas JM, Stahl M, Nilsson M.

Survival benefit and additional value of preoperative chemoradiotherapy in resectable gastric and gastro-oesophageal junction cancer: a direct and adjusted indirect comparison meta-analysis.

Eur Surg Oncol 2015; 41:282-94.

Hainsworth JD, Daugaard G, Lesimple T, Hübner G, Greco FA, Stahl M, Büschenfelde CM, Allouache D, Penel N, Knoblauch P, Fizazi KS


Carboplatin/Paclitaxel with or without Belinostat as empiric first-line treatment for patients with carcinoma of unknown primary site: a randomized phase II trial.

Cancer 2015; 121:1654-61

Putora PM, Bedenne L, Budach W, Eisterer W, van der Gaast A, Jäger R, van Lanschot JJ, Mariette C, Schnider A, Stahl M, Ruhstaller T.

Oesophageal cancer: exploring controversies overview of experts' opinions of Austria, Germany, France, Netherlands and Switzerland.

Radiat Oncol 2015; 10: 116



Hofheinz RD, Gencer D, Schulz H, Stahl M, Hegewisch-Becker S, Loeffler LM, Kronawitter U, Bolz G, Potenberg J, Tauchert F, Schneeweis A.


Mapisal versus urea cream as prophylaxis for capecitabine-associated hand-foot-syndrome: a randomized phase III trial of the AIO Quality Of Life Working Group.

Clin Oncol 2015; 33:2444-9

Porschen R, Buck A, Fischbach W, Gockel I, Görling U, Grenacher L, Hollerbach S, Hölscher A, Körber J, Messman H, Meyer HJ, Miehle S, Möhler M, Nöthlings U, Pech U, Schmidberger H, Schmidt M, Stahl M, Stuschke M, Thuss-Patients P, Trojan J, Vanhöfer U, Weimann A, Wenz F, Wullstein C.

S3-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Plattenepithelkarzinome und Adenokarzinome des Ösophagus (Langversion 1.0 – September 2015, AWMF-Registernummer 021/023OL).

Gastroenterol 2015; 53:1288-347



Übersichtsarbeiten/Kommentare (Auszug ab 2015)

2018

Stahl M.

Perioperative Chemotherapie bei Magenkarzinom: FLOT ist der Therapiestandard.

Karger Kompass Onkol 2018; 5:25-26.

Stahl M.

Gibt es Fortschritte in der Routinebehandlung von Patienten mit fortgeschrittenem Pankreaskarzinom?

Karger Kompass Onkol 2018; 5:94-95.

2017

Stahl M, Budach V.

Definitive chemoradiotherapy.

Thorac Dis 2017; doi:10.21037/jtd.2017.05.05

2016

Stahl M.

Präoperative Therapie beim grenzwertig/nicht resektablen Pankreaskarzinom.

Karger Kompass Onkol 2016; 3:41-42.

2015

Stahl M.

Auswirkungen einer neoadjuvanten Chemotherapie mit S-1 plus Cisplatin bei szirrhösem Magenkarzinom.

Karger Kompass Onkol 2015; 2:22-23